



AA-11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΟ. Η ΕΜΠΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

Γεράσιμος Φραγκούλης, Ιωάννης Χριστοδουλίδης, Χρήστος Κατσακιώρης, Παναγιώτης Βουρίκης, Γρηγόρης Θεοδωρόπουλος, Εμμανουήλ Τσαγκατάκης, Δημήτριος Καραναστάσης
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. "Η Ελπίς", Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

Η ριζική προστατεκτομή αποτελεί μείζον ακρωτηριαστικό χειρουργείο για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη με σημαντικές συνέπειες στο μηχανισμό εγκράτειας των ούρων καθώς και τη στυτική λειτουργία. Σκοπος της εργασίας είναι η ανάλυση της επίπτωσης της ριζικής προστατεκτομής στην εγκράτεια ούρων και τη στύση σε ασθενείς με νευρολογική νόσο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Κατά τη περίοδο Ιανουάριος 2004 - Δεκέμβριος 2015, 36 ασθενείς με συνοδο νευρολογική νόσο υπεβλήθησαν σε ριζική προστατεκτομή. Στο συνολό τους αποτελούσαν περιστατικά με μοναδική συνοσπρότητα ήπια νευρολογική νόσο υπό αγωγή εκ των οποίων οι 31 (86%) περιπτώσεις αφορούσαν νόσο Parkinson και οι 5 (14%) νόσο Alzheimer. Η μέση ηλικία ήταν τα 68.6 έτη. Προεγχειρητικά οι 35 (97%) ανέφεραν πλήρη εγκράτεια ενώ 11 (29%) ανέφεραν ότι έχουν στύση επαρκή για σεξουαλική επαφή με μέσο IIEF-5 score 21,3 ενώ το μέσο IIEF-5 score μεταξύ όλων των ασθενών ήταν 11,7. Εκτιμήθηκε η επίπτωση της ριζικής προστατεκτομής στην εγκράτεια ούρων και τη στυτική λειτουργία μετεγχειρητικά στους 6 και 12 μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά το follow up στους 6 και 12 μήνες 27 (75%) και 12 (33%) ασθενείς ανέφεραν ακράτεια ούρων οριζόμενη ως η χρήση πανών ακράτειας. Σοβαρού, μετρίου και μικρού βαθμού ακράτεια ανεφεραν 12 (33%) / 11 (30%) / 4 (11%) και 4 (11%) / 3 (8%) / 5 (14%) ασθενείς στους 6 και 12 μήνες. Το μέσο IIEF-5 score στους 6 και 12 μήνες ήταν στο 5,6 και 5,5 για το σύνολο των ασθενών και 8,9 και 9,1 για την ομάδα των ασθενών που προεγχειρητικά ανέφεραν σεξουαλική δραστηριότητα ενώ κανένας δεν ήταν σε θέση να έχει σεξουαλική επαφή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ριζική προστατεκτομή αποτελεί μια επέμβαση με σημαντικά χειρότερα λειτουργικά αποτελέσματα σε νευρολογικούς ασθενείς σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.