



ΠΑ-02

ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ: ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ Ή ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ;*Αθανάσιος Ζαχαρίου¹, Μαρία Φιλιπόνη², Δημήτριος Μπαλτογιάννης¹, Ιωάννης Γιαννάκης¹, Άρης Καλτσάς¹, Παναγιώτης Χαμψηλομάτης¹, Σταύρος Τσαμπαλός¹, Νικόλαος Σοφικίτης¹*¹ Ουρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα² Ουρολογικό Τμήμα, Γενική Κλινική ΕΛΠΙΣ, Βόλος**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η υπερλειτουργική ουροδόχος κύστη (ΟΑΒ) συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Τα δεδομένα όμως που υπάρχουν για τη σχέση ΟΑΒ και γυναικείας σεξουαλικής δυσφορίας είναι ελλιπή και αποσπασματικά. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της σεξουαλικής δυσφορίας γυναικών με ΟΑΒ.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα Α (control group) με 112 γυναίκες και ομάδα Β με 95 γυναίκες που έπασχαν από ΟΑΒ. Οι γυναίκες αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS-R, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα) και το ερωτηματολόγιο Female Sexual Function Index (FSFI-Gr, πιστοποιημένο στην ελληνική γλώσσα).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα αποτελέσματα των δύο ομάδων με τιμή $P < 0.05$

	Ομάδα Α	Ομάδα Β
Επιθυμία	4.6±0.3	3.1±0.2
Διέγερση	4.8±0.3	3.0±0.2
Ύγγραση	4.8±0.3	3.5±0.2
Οργασμός	4.6±0.3	3.6±0.3
Ικανοποίηση	4.7±0.4	3.0±0.3
Πόνος	4.7±0.4	2.9±0.3
Ολικό άθροισμα FSFI	28.2±2.0	19.1±1.5
1 Δυσφορία	1.1±0.2	2.4±0.3
2 Δυστυχία για τη σεξουαλική σχέση	1.1±0.1	2.3±0.3
3 Ενοχή	0.9±0.1	1.9±0.3
4 Αποθάρρυνση	0.9±0.2	1.9±0.3
5 Άγχος για το sex	1.0±0.1	2.1±0.3
6 Αίσθημα κατωτερότητας	1.2±0.2	2.5±0.3
7 Ανησυχία	1.2±0.1	2.4±0.3



ΠΑ-02

8 Σεξουαλικά ανεπαρκής	1.2±0.2	2.3±0.4
9 Λύπη	0.9±0.2	2.5±0.2
10 Ντροπή	1.2±0.1	2.4±0.3
11 Απογοήτευση	1.1±0.1	2.3±0.3
12 Θυμός	1.1±0.2	2.4±0.2
13 Προβληματισμένη για μειωμένη σεξουαλική επιθυμία	1.2±0.1	2.1±0.3
FSDS total	14.1±1.9	29.5±3.8

Στην ομάδα Α το ποσοστό της σεξουαλικής δυσλειτουργίας ανέρχεται στο 22.2% ενώ στην ομάδα Β στο 47.4%. Παρόμοια, το ποσοστό της σεξουαλικής δυσφορίας στην ομάδα Α ανέρχεται περίπου στο 19.1% ενώ στην ομάδα Β στο 38.7%. Τέλος η πλειοψηφία των γυναικών με ΟΑΒ και γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία παρουσιάζουν επίσης και σεξουαλική δυσφορία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γυναίκες με υπερλειτουργική κύστη παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής δυσλειτουργίας και σεξουαλικής δυσφορίας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.



ΠΑ-03

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΑΣ ΚΥΣΤΗΣ ΣΤΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Μερκούριος Κόλβατζης, Κωνσταντίνος-Βάιος Μυτιλέκας, Αθανάσιος Οικονόμου, Πέτρος Γεωργόπουλος, Ιωάννης Αποστολίδης, Έλενα Ιωαννίδου, Μαρίνα Καλαϊτζή, Ευάγγελος Ιωαννίδης, Απόστολος Αποστολίδης Β΄ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

Το σύνδρομο υπερδραστικής κύστης (ΟΑΒ) και η μειωμένη λειτουργική χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης αποτελούν αναγνωρισμένα αίτια νυκτερινής ενούρησης (ΝΕ) στα παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν λίγα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την χρήση αντιμουςκαρινικών στη θεραπεία της ΝΕ, με την έρευνα να εστιάζει κυρίως στην αντιμετώπιση της νυκτερινής πολυουρίας. Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να αναλύσουμε αναδρομικά τη συμπεριφορά της ΝΕ σε παιδιατρικούς ασθενείς που αναζήτησαν θεραπεία στο ιατρείο Λειτουργικής Ουρολογίας ενός Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου, εστιάζοντας στην παρουσία ΟΑΒ και την επίδραση των αντιμουςκαρινικών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Η αναδρομική ανασκόπηση δεδομένων επικεντρώθηκε σε παιδιατρικούς ασθενείς, με πρωτεύον σύμπτωμα την ΝΕ. Σύμφωνα με τη ρουτίνα του Ιατρείου, όλοι οι ασθενείς είχαν εκτιμηθεί με ιστορικό, κλινική εξέταση, ουροροομετρία και μέτρηση υπολειπόμενου μετά ούρηση, υπερηχογράφημα κύστης-νεφρών, και Ζήμερο ημερολόγιο ουρήσεων όπου καταγράφονταν ο αριθμός και οι ώρες των επεισοδίων ουρήσης, ο όγκος ούρων ανά ούρηση, η κατανάλωση υγρών, το βάρος της πάνας τη νύκτα και τυχόν επεισοδια ημερήσιας ακράτειας. Αναδρομικά αναλύθηκε η παρουσία της πρωτοπαθούς έναντι